

# ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES

26<sup>e</sup> Mémoire (1)

## XLI

### Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de l'ordre des ARANEÆ

Par EUGÈNE SIMON.

Séance du 9 mai 1894.

#### Familia THERIDIIDÆ (2).

**Synotaxus uncatus**, n. sp. — ♂ ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax luridus, lœvis, pilis longis, tenuibus et erectis conspersus. Abdomen sat breve sed in tuberculum longissimum et obliquum productum, omnino albo-testaceum. Pedes longissimi et graciles, pallide luridi, articulationibus leviter rufulis, pilis longis tenuibus vestiti. Pedes-maxillares maris luridi, apice nigri; femore recto et cylindrato, supra ad apicem aculeo acutissimo et leviter uncato munito; patella magna, convexa, supra ad apicem dente fusca majore acuta et antice directa, instructa; tibia parva, cylindracea; tarso bulboque sat magnis et ovatis. Pedes-maxillares feminæ graciles, tibia patella longiore, tarso tibia cum patella simul sumptis multo longiore. Area vulvæ foveolis binis rotundis et rufulis impressa. — Brasilia : Rio.

**S. turbinatus**, n. sp. — ♂. Long. 3,7 mill. — Omnino luridus, a præcedenti, cui valde affinis et subsimilis est, pedum-maxillarium maris

(1) Voir pour les mémoires 1 à 25, n<sup>o</sup> 1 à XL, Annales de 1873 à 1893.

(2) Pour les genres *Synotaxus*, *Propostira*, *Tomoxena*, *Meotipa*, *Episynopsis*, *Coscinida*, *Diaprocorus*, *Stictoxena*, *Philtro*, *Sphyrotinus*, *Hyocrea*, *Scymopagia*, *Gnophomytis*, *Histogramia* et *Ancocoelus*, cf. E. Simon, Hist. nat. des Araignées, 2<sup>e</sup> éd., fasc. III.

femore mutico, dente patellari acutiore et apice extus curvato, differt.  
— Venezuela !.

**Helvibis Germaini**, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax tenuiter rugosus, sat longe et parce albo-pilosus, fusco-rufescens, versus medium vitta transversa latissima dilutiore notatus, regione frontali obscuriore. Oculi medii antici a lateralibus quam inter se remotiores. Sternum fusco-rufescens, coriaceum. Abdomen cylindraceum, in tuberculum longum, crassum sed subacutum longe productum, omnino cinereo-testaceum, plagula epigasteris parva nigra. Pedes tenues, longi, flavo-rufescentes, femoribus coxisque dilutoribus.

♂. Long. 4,5 mill. — Feminae subsimilis sed cephalothorace in medio latiore, abdome multo breviore, tuberculo apicali crassiore et obtusiore, pallide testaceo, sed antice, praesertim subtus, sensim infuscato. Pedes-maxillares nigricantes, patella parva nodiformi, tibia brevissima cupuliformi, tarso bulboque maximis. — Brasilia : Mato-Grosso (Germain).

**Propostira quadrangulosa**, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax, chelae sternumque flavo-aurantiaca, subtilissime coriacea. Abdomen antice sat angustum et truncatum, postice valde elevatum et ampliatum, supra subquadratum et tuberculis angularibus quatuor, anticis acutis, posticis minoribus et obtusis, instructum, pallide luteum, tuberculis nigris, supra antice vittis duabus longitudinalibus latis saepe interruptis, postice, in declivitate, lineolis transversis 2 vel 3, subtus utrinque vitta marginali arcuata antice truncata et leviter ampliata nigricantibus, decoratum. Pedes flavi, articulis versus extremitates sensim aurantiaco-tinctis. — Ceylan : Colombo, Kandy !.

**Audifia semigranosa**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Ab *A. levithoraci* Keyserl. differt parte cephalica magna, leviter convexa, laevi, postice a thoracica humiliore et rugosa stria profunda et procurva discreta, oculis posticis minoribus inter se late et fere aequae separatis, abdome omnino laevi et nitidissimo subtus in medio minutissime et parcissime punctato (in *A. levithoraci* Keyserl., abdome subtus grossius impresso-punctato et foveolis binis majoribus notato). — Cephalothorax nigro-rufescens. Abdomen nigerrimum, nitidissimum, parcissime et longe albosetosum. Pedum coxae trochanteresque lutei, femora antica nigra, reliqui articuli fulvo-rufescentes et nigro-vittati. — Amazonas : Tefé (de Mathan).

**Tomoxena dives**, n. sp. — ♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax

fulvo-rufescens, postice utrinque anguste fusco-marginatus. Area oculorum mediorum aequa longa ac lata. Abdomen magnum sed longius quam latius, triquetrum, antice latum et utrinque subacute angulosum, postice longe attenuatum, supra latissime et crebre argenteo-guttulatum, in medio macula maxima arcum minorem includente et postice macula magna triquetra nitide-roseis decoratum, subtus fulvum, utrinque argenteo-guttulatum. Sternum albidum. Chelæ, partes oris, pedesque luridi, patellis rufulis, tibiis apice rufulo-annulatis, metatarsis 4<sup>i</sup> et 4<sup>i</sup> parium apice nigro-annulatis. Vulvæ fovea minutissima subrotunda. — India merid. : Trichinopoly (R. P. Malat).

**T. flavomaculata**, n. sp. — ♀. Long. 4,3 mill. — Cephalothorax aurantiacus, regione oculorum clypeoque nigris. Abdomen magnum, antice breviter postice longius attenuatum et obtusum, supra nitidum, fulvum, maculis magnis flavo-opacis triseriatis (serie media ex maculis quatuor, 4<sup>a</sup> elongata, reliquis subrotundis, seriebus lateralibus ex maculis binis magnis, ovato-transversis), utrinque ad angulum atque ad apicem maculis nigris rotundis, læte decoratum, subtus olivaceum. Sternum rufescens, nitidum. Partes oris, pedes-maxillares pedesque fulvo-castanei, coxis femoribusque dilutioribus et aurantiacis. Vulva simplex, postice carinula transversa obtusa prædita.

♂. Long. 3,2 mill. — Minor, abdomen brevius in medio longitudinale infuscatum, maculis nigris trinis præditum, sed maculis flavis carens, parce setosum et punctis depressis majoribus impressum. Pedes longiores, subnigri, coxis basique femorum fulvis. Pedes-maxillares fusi, breves et robusti; femore gracili; patella parva, nodosa; tibia brevissima, transversa, cupuliformi; tarso magno, late ovato, apice abrupte angustiore subacute et bulbum leviter superante; bulbo maximo ovato. — Sumatra.

**Meotipa picturata**, n. sp. — ♀. Long. 4,3 mill. — Cephalothorax luridus, vitta media, extremitates haud attingente, postice vitta transversa recurva cruciata, rufula, ornatus. Oculi rufulo-cincti. Clypeus linea media rufula notatus. Abdomen breviter ovatum, postice tuberculo magno erecto et utrinque tuberculis minoribus rotundis munitum, testaceum, crebre albo-punctatum et parce roseo-variegatum, tuberculis lateralibus roseis et nitidis. Sternum infuscatum. Chelæ, partes oris pedesque luridi, femoribus subtus minute et parce rufulo-punctatis, tibiis 4<sup>i</sup> et 4<sup>i</sup> parium annulo apicali fusco-rufulo ornatis, annulo tibiarum 4<sup>i</sup> paris pilis nigris magnis et lanceolatis munito. — India merid. : Montes Kodeikanel.

**M. vesiculosus**, n. sp. — ♀. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax luridus, vitta media oculos attingente et pone medium vitta transversa abbreviata cruciata, fusco-rufula, ornatus, regione oculorum clypeoque late infuscatis. Abdomen tuberculo postico magno et obtusissimo et utrinque tuberculis minoribus binis, globosis, munitum, supra infuscatum et maculis albis iniquis et biseriatis ornatum, tuberculis lateralibus nigro-nitidis, tuberculo magno pilis nigris crasse lanceolatis hirsuto. Chelæ, partes oris, sternumque fusca, hoc linea media abbreviata punctisque marginalibus fulvis notatum. Pedes-maxillares pedesque luridi, parce et inordinate nigro-punctati, femoribus, tibiis metatarsisque annulo apicali nigro munitis, patellis infuscatis, femoribus ad apicem, patellis tibiisque supra et præsentim tibiis ad apicem pilis crassis nigris et lanceolatis insigniter munitis. — Ins. Phil. : Manila !.

**Thwaitesia algerica**, n. sp. — ♀. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax pedesque pallide luridi, tibiis 4<sup>i</sup> paris utrinque ad apicem minute nigro-notatis. Abdomen ovatum, postice elevatum et conicum, fulvo-testaceum, supra pallide flavo-opacum et vitta media fulva ramosa notatum. Patellæ cunctæ ad apicem, tibiæ prope medium, seta spiniformi longa et erecta instructæ. Area vulvæ simplex, transversa, fulva et utrinque foveola parva rotunda, nigra, notata. — Alg. : Maison-Carrée !.

**Janulus taprobanicus**, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax pallide luteus, anguste nigro-cinctus, regione oculari tuberculisque frontalibus nigris. Oculi postici mediocres (medii paulo maiores), medii inter se distantes (spatio interoculari oculum circiter æquante), a lateralibus anguste separati. Abdomen æque longum ac latum, antice rotundum, postice ampliatum et truncatum, supra testaceum, parce albo-punctatum, utrinque confuse infuscatum et postice, in declivitate, late fusco-marginatum, subtus omnino luridum. Sternum pedesque lutea, femoribus, tibiis metatarsisque apice minute fusco-annulatis. Pedes-maxillares lutei; femore gracili subrecto; patella plus duplo longiore quam latiore, cylindrata; tibia patella circiter æque longa, ad basin angustiore; tarso sat anguste ovato, tibia et patella simul sumptis haud longiore.

♀. Long. 2,5 mill. — Mari subsimilis sed cephalothorace lurido, anguste fusco-cineto et vitta media lata fusco-rufula notato, pedibus luteis, quatuor anticis leviter infuscatis, femoribus tibiisque 4<sup>i</sup> paris apice fusco-annulatis. — Ceylan : Kandy !, Nuwara-Eliya !.

**J. pictus**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax rufo-casta-

neus, opacus. Oculi postici in lineam leviter recurvam, medii ovati, lateralibus paulo maiores, a lateralibus vix separati sed inter se spatio oculo paulo latiore distantes. Tubercula frontalia contigua et obtusissima. Abdomen paulo longius quam latius, antice rotundum, postice sensim ampliatum et obtusissimum, supra deplanatum, fusco-lividum, nigro-reticulatum, crebre et inordinate albo-punctatum, subtus castaneum et late albido-marginatum. Sternum nigro-rufescens. Coxæ fulvae. Pedes pallide luridi, subpelluentes, femoribus 4<sup>i</sup> paris subtus rufo-lineatis.— Singapore !.

**J. malachinus**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax, chelæ, partes oris, sternum, coxaeque obscure fulvo-olivacea, sublaevia, tuberculis frontalibus nigris, fronte oculisque ordinariis. Abdomen globosum (haud angulosum) cinereo-lividum, supra parcissime albo-punctatum atque in medio macula alba majore obtusissime triquetra ornatum. Pedes-maxillares pedesque longissimi, omnino pallide luridi. Fovea genitalis minutissima, rotunda, nigro-marginata. — Peruvia or. : Pebas (de Mathan).

**J. nebulosus**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax luridus, parce albo-pilosus, utrinque vitta latissima et dentata nigricanti marginatus, tuberculis frontalibus nigris, conicis et subacutis. Oculi postici magni, subæquales (medii vix maiores), medii inter se distantes (spatio interoculari oculo paulo angustiore), utrinque a lateralibus haud separati. Abdomen æque longum ac latum, antice rotundum, postice ampliatum et truncatum, supra cinereo-nigricans, parce albo-pilosum et postice, in declivitate, parce et inordinate testaceo-punctatum, subtus paulo dilutius et utrinque late albido-plagiatum. Sternum pedesque fulvo-olivacea, femoribus tibiisque 4<sup>i</sup> et 4<sup>i</sup> parium apice fusco-annulatis. — Brasilia (prov. Pernambuco : Serra de Communatty (E. Gounelle).

**J. salobrensis**, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax flavidus, versus marginem aurantiaco-tinctus, in medio laevis, utrinque subtiliter coriaceus et pilis crassis albidis pronis munitus, tuberculis frontalibus nigris, contiguis et subrotundis, oculis similibus. Oculi postici in lineam valde recurvam, magni (medii lateralibus paulo minores), medii inter se distantes (spatio interoculari oculo paulo latiore) sed a lateralibus haud separati. Abdomen æque longum ac latum, antice rotundum, postice valde ampliatum et recte truncatum, fulvo-aurantiacum, utrinque, ad angulos posticos, minute nigro-notatum. Sternum fulvum. Pedes flavo-aurantiaci, femoribus versus basin dilutioribus.

Area vulvæ parva et nigra, foveola subrotunda plagulam rufulam includente, notata. — Brasilia (prov. Bahia) : Salobro (E. Gounelle).

**J. bicruciatu**s, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Praecedenti valde affinis et subsimilis, differt oculis mediis posticis inter se minus distan-  
tibus (spatio interoculari oculo angustiore), tuberculis paulo majoribus  
et conicis, abdōmine fulvo, vitta longitudinali lata vittisque transversis  
binis fuscis ornato, mamillis albo-cinctis et utrinque nigro-maculatis. —  
Brasilia : Mato-Grosso (Germain).

**J. Germaini**, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax luridus,  
utrinque vitta marginali lata fusco-rufula et leviter reticulata notatus,  
tuberculis frontalibus nigris, parte thoracica minute biimpressa. Oculi  
postici magni æqui in lineam valde recurvam, medii inter se distantes  
(sed spatio interoculari oculo multo minore, a lateralibus haud separati).  
Abdomen paulo latius quam longius, antice rotundum, postice amplia-  
tum et truncatum, angulis leviter prominulis, pallide testaceum, parce  
albo-punctatum, utrinque et postice, in declivitate, fusco-reticulatum  
(parte dorsali testacea maculam magnam triquetram designante), subtus  
fulvum et postice, prope mamillas, confuse infuscatum. Sternum pedes-  
que flavida, femoribus, patellis tibiisque 4<sup>i</sup> paris leviter infuscatis, patellis  
tibiisque 4<sup>i</sup> paris apice fusco-annulatis. — Paraguay (Germain).

*J. bicornigero* E. Sim. (*Theridion bicorne* Keyserl.) sat affinis.

**Episinopsis albostriatus**, n. sp. — ♀. Long. 4,5 mill. — Ce-  
phalothorax fusco-rufescens, opacus, tuberculis ocularibus geminatis  
mamilliformibus. Abdomen magnum, vix longius quam latius, antice  
anguste et obtuse truncatum, versus medium valde ampliatum et utrin-  
que tuberculatum, postice valde attenuatum et decline, in parte antica  
(usque ad tuberculos) nigricans et testaceo-variatum, in parte altera  
fulvum et transversim nigricanti-vittatum, subtus nigricans et utrinque  
linea flexuosa testacea marginatum. Sternum, chelæ pedesque fusco-  
castanea, femoribus sex posterioribus in parte basali dilutioribus et  
fulvis. Vulva fovea vel rima transversa simplici munita. — Peruvia  
orient. : Pebas (de Mathan).

**E. rhomboidalis**, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — A praecedenti differt  
oculis posticis paulo majoribus, tuberculis ocularibus humillimis vix pers-  
picuis. — Abdomen supra fuscum et leviter testaceo-variatum, in parte  
prima vittis transversis binis nigris, in medio ampliatis, angulosis et  
tenuiter albo-marginatis, decoratum, in parte altera, pone tuberculos,  
vitta transversa latiore albida notatum, subtus nigricans et postice

utrinque late testaceo-plagiatum. Sternum pedesque obscure fusca, trochanteribus femoribusque cunctis ad basin, et metatarsis 4<sup>i</sup> paris ad basin luridis. — Singapore !.

**Diaprocorus multipunctatus**, n. sp. — Long. 4,6 mill. — Cephalothorax flavo-rufescens, regione oculorum nigra, clypeo confuse infuscato, area oculorum vix latiore et chelis breviore. Abdomen magnum, antice ample rotundum, postice acuminatum, supra fulvum, antice in declivitate arcu nigro in medio dentato cinctum, supra punctis argenteis minutissimis, in medio parce in lateribus densius, et guttulis nigris numerosis parum regulariter seriatis, decoratum, subtus testaceum. Chelæ fulvae antice infuscatae. Sternum, partes oris pedesque omnino flavo-aurantiaca, parce et longe nigro-crinita. Area vulvæ fusca, fovea parum profunda, transversim ovata, notata. — Nova-Holl. : Victoria inter.

**Coscinida tibialis**, n. sp. — ♂ ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, sublævis, versus marginem subtilissime coriaceus. Oculi prominuli, postici magni, medii inter se anguste separati sed a lateribus contigui. Abdomen longe ovatum, nigrum, sat longe pubescens, maculis parvis flavidis supra decoratum (ad marginem anticum macula unica, dein maculis binis, prope medium maculis quatuor, seriem transversam designantibus). Sternum nigrum sublæve. Pedes longi, late flavo-aurantiaci, tibiis 4<sup>i</sup> paris nigris. Pedes-maxillares maris flavidi, patella convexa et arcuata, tibia brevissima cupuliformi, tarso bulboque sat longe ovatis. — Alg. merid. : Biskra.

**C. subtilis**, n. sp. — ♂. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax sublævis, regione oculorum valde prominula nigra, vitta media postice attenuata et acute triquetra nigricanti, notatus. Oculi postici inter se subcontigui, medii lateralibus majores. Abdomen breviter oblongum, atrum, parce et longe setosum, maculis magnis sex biseriatis (3-3) maculaque postica majore, obscure testaceis, ornatum. Mamilla testacea. Sternum nigrum, leue. Pedes longi, antici posticis paulo longiores, flavo-aurantiaci. Pedes-maxillares flavidi, patella nodosa, tibia brevi, cupuliformi, tarso mediocri ovato, bulbo simplici. — Venezuela : San-Esteban !.

**C. novemnotata**, n. sp. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax sternumque nigro-rufescens, subtiliter coriacea. Abdomen nigrum, supra maculis albis novem ornatum : ad marginem anticum maculis duabus ovatis et subgeminatis, prope medium maculis minoribus binis transversim remotioribus, postice macula unica transversa et utrinque

in lateribus maculis duabus elongatis, subtus regione epigasteris leviter coriacea et rufula. Pedes (præsertim postici) longi et robusti, rufo-castanei, coxis trochanteribusque luteis, femoribus anticis usque ad basin, posticis tantum ad apicem, valde infuscatis, femoribus subtus leviter rugosis. Pedes-maxillares castanei, patella parva et nodosa, tibia brevissima cupuliformi, tarso magno, ovato, apice bidentato. — Ceylan : Kandy !.

**C. gentilis**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax sublaevis, fulvo-olivaceus, regione oculorum nigra, regione thoracica vitta media vittisque marginalibus confuse infuscatis notata. Abdomen nigrum, ad marginem anticum paulo dilutius, in medio punctis albis parvis quatuor, quadratum magnum designantibus, et utrinque maculis binis majoribus albis decoratum. Sternum olivaceum, tenuissime nigro-marginalatum. Pedes luridi, tibiis anticis infuscatis. Pedes-maxillares fusi. Area vulva leviter depressa et carinula rufula antice bifida et Y formante, notata. — Ceylan : Colombo !.

**Stictoxena sertata**, n. sp. — ♂. Long. 1,8 mill. — Albo-testacea, cephalothorace linea marginali exili, vittaque media lata, oculos cunctos includente; nigricantibus, ornato, abdomine cordiformi, postice acuminate, setis longissimis paucis nigris albisque consperso, utrinque cinereo-punctato et confuse bivittato, postice maculis binis subgeminatis et supra mamillas linea longitudinali abbreviata nigris ornato, pedibus subpellucientibus, olivaceo-annulatis, patellis tibiisque supra setis robustis longissimis paucis munitis (in patellis 1, in tibiis 2). — Pedes-maxillares sat graciles, patella cylindrata, tibia patella haud breviore, apice ampliata, tarso sat parvo et obtuso. — Ceylan : Nuw.-Eliya !.

**Theridion Macei**, n. sp. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax, sternum, partes oris, pedes-maxillares pedesque albo-testacea, subpellucientia. Abdomen albidum, parcissime argenteo-guttulatum, breviter ovatum, postice in tuberculum subacutum productum. Pedum-maxillarium femur gracile sat longum et subrectum, patella circiter 4/3 longior quam latior, versus basin leviter attenuata, tibia patella paulo brevior et latior, apice recte secta, tarsus sat anguste ovatus et acuminatus, bulbus stylo magno munitus. — Africa occid. : Congo.

**T. impressithorax**, n. sp. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax pallide luridus, utrinque linea marginali exili nigra cinctus, planus, striis cephalicis, sulco medio thoracio lato, striaque submarginali, profunde impressus. Abdomen breviter ovatum, postice rotundum et vix

prominulum, albidum, parcissime et minutissime fusco-punctatum et maculis majoribus nigris tribus (anticis binis subtriquetris, altera apicali trapezoidali) supra ornatum. Chelæ, sternum pedesque pallide lurida, tibiis metatarsisque ad apicem minute nigro-annulatis. Pedes-maxillares luridi, apice infuscati, patella nodiformi, tibia brevi sed extus longe producta et laminiformi, bulbo maximo globoso. — Ins. Philippinæ : Manila !.

**T. Derhami**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax nitidus, fusco-rufescens, fronte leviter prominenti fere *Dipænæ*. Oculi postici sat magni, in lineam subrectam, medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi medii antici lateralibus majores. Area mediorum subquadrata. Clypeus area oculorum latior sed chelis angustior. Sternum nigro-nitidum, postice attenuatum et inter coxas posticas productum. Abdomen globosum, nitidum, fusco-lividum, supra maculis albis quadriseriatis (3-4-4-3) structe decoratum. Chelæ luteæ. Pedes longi, fusco-olivacei, femoribus 4<sup>1</sup> paris annulo medio luteo notatis. — Africa occid. : Sierra-Leone.

**T. rostriferum**, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax fuscus, subtiliter et crebre nigro-atomarius, antice acclivis. Oculi postici in lineam rectam, inter se fere aequæ et sat late distantes. Oculi medii antici reliquis paulo majores et valde prominuli. Abdomen breviter ovatum, obscure fulvum, crebre nigro-punctatum et punctis albis, antice lineas binas longitudinales abbreviatas, prope medium lineas transversas binas (alteram rectam, alteram recurvam) et postice maculam triquetram designantibus, supra ornatum, subtus nigricans et pone medium macula parva transversa alba ornatum. Sternum fulvum, utrinque, ad marginem, nigro-tripunctatum. Pedes lutei, femoribus subtus nigro-vittatis, tibiis metatarsisque subannulatis. Pedes-maxillares valde singulares, bulbo maximo disciformi apophysem rostriformem longissimam emitente et stylo libero longo circumdato. — Africa occid. : Ogoué.

**T. cidrelicola**, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax fusco-olivaceus, leviter nigro-reticulatus. Oculi postici magni, aequi, inter se sat anguste et fere aequæ distantes. Cheke et partes oris fusco-olivacea. Abdomen magnum, globosum, nigro-nitidum, supra longitudinaliter dilutius, antice macula media elongata, postice, in declivitate, linea abbreviata et utrinque semicirculo magno, plerumque interrupto, albocapitis decoratum. Sternum nigro-nitidum, leviter convexum. Pedes fulvo-rufescentes, femoribus ad basin coxisque dilutioribus, coxis

$4^{\text{i}}$  paris intus dente acuta et leviter uncata armatis. Regio epigasteris area magna testacea, transversim semicirculari, notata.

♂. Long. 2,3 mill. — Cephalothorax nigro-nitidus. Oculi minores Abdomen minus, utrinque nigro-punctatum, supra linea media et prope medium punctis duobus majoribus nigris notatum. Pedes luridi, valde et late nigro-annulati. Pedes  $1^{\text{i}}$  paris reliquis multo crassiores, femore robustissimo et leviter curvato, tibia robusta sed apice abrupte angustiore, leviter arcuata, intus aculeis gracilibus et longis 6-7 uniseriatis atque ad apicem aculeo validiore elevato et paululum lanceolato instructa, metatarso gracili, arcuato, intus setis curvatis, uniseriatis, atque ad apicem calcare acuto et uncato armato; coxis  $4^{\text{i}}$  paris intus convexis sed muticis. Pedes-maxillares valde singulares; patella parva; tibia maxima, late ovata, ad basin breviter et anguste pediculata, ad apicem truncata; tarso minutissimo, linguiformi; bulbo simplici depressiuseculo terminali — Venezuela : Colonia Tovar !.

**T. nodiferum**, n. sp. — ♂. Long. 2,8 mill. — Cephalothorax laevis, fusco-rufescens, nigro-marginatus, regione frontali et parte cephalica postice infuscatis. Oculi postici in lineam subrectam (vix recurvam), fere æquidistantes, spatiis interocularibus oculis latioribus. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii lateralibus majores. Clypeus area oculorum multo latior, verticalis. Abdomen convexum, altum sed supra deplanatum et utrinque lobis magnis rotundis et contiguis marginatum, supra fuscum, maculis albis, series duas designantibus, ornatum, tuberculis nigro-nitidis subtus albo-cinctis; abdomen subtus fulvum, macula transversa nigra, mamillis rufescensibus, supra late nigro-cinetis. Sternum et partes oris nigra. Chelae rufescentes, antice, ad apicem, supra radicem unguis, dente obtusa et depressa instructæ. Pedes longi, antici posticis multo longiores, fulvo-rufuli, femoribus ad basin, metatarsis tarsisque dilutioribus. Pedes-maxillares fulvi apice castanei; patella parva convexa; tibia brevi, sed subtus ampliata; tarso bulboque simpliciter ovatis.

♀. Long. 3 mill. — Mari subsimilis, sed abdome multo majore, pedibus fulvis, patellis tibiisque anticus infuscatis, posticus annulatis. — Ceylan : Kandy, Nuwara-Eliya !.

*T. (Mastostigmo) decemperlato* E. Sim. sat affine.

**T. pandani**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax luridus, parte cephalica postice leviter infuscata, parte thoracica linea marginali nigricanti, postice sensim ampliata, utrinque cincta. Oculi postici sat

magni, in lineam levissime recurvam, medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus majores. Area mediorum antice quam postice latior. Abdomen globosum, supra albidum, tenuiter et crebre fulvo-reticulatum, vitta media lassisima albidiore, utrinque profunde et subacute dentata et postice, supra mamillas, maculis binis elongatis nigris, notatum, subtus luteum, postice, ante mamillas, macula nigra parva et transversa notatum, regione epigasteris rufula, leviter convexa, foveola media impressa. Sternum et partes oris fusco-rufescentia. Chelæ fulvae, longitudinaliter infuscatae. Pedes longi, pallide luridi, femoribus tibiisque anticis minute et parcissime nigro-punctatis, tibiis 4<sup>i</sup> paris annulo submedio annuloque apicali angustis nigris, metatarsis 4<sup>i</sup> paris annulo apicali simili notatis.

♂. Long. 2,5 mill. — A femina differt regione frontali paululum proximula, abdome obscuriore, humiliore et ovato, regione epigasteris majore, rufula, postice nigra et leviter acuminata. Pedum-maxillarium tarsus maximus, cephalothorace toto vix minor, compressus, valde arcuatus et reniformis, bulbus disciformis, in medio lobatus, stylo nigro longissimo et spirali insigniter munitus. — Saïgon !.

**T. teliferum**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax ovatus, antice parum attenuatus, fronte lata, luridus, tenuissime nigro-cinctus, in medio late et confuse olivaceus. Oculi postici parvi, aequi, in lineam levissime procurvam, inter se late et fere aequae distantes (spatiis interocularibus oculis plus duplo latioribus). Oculi antici in lineam vix procurvam, medii lateralibus paulo majores et inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Area mediorum parallela et paulo latior quam longior. Abdomen sat longe ovatum, albidum, punctis nigris valde inquis, in lateribus inordinatis, in medio vitta lata designantibus supra ornatum, subtus puncto medio majore nigro, notatum. Sternum fulvum, utrinque ad marginem, nigro-tripunctatum. Chelæ fulvae, robustæ et longæ, margine superiore sulci dentibus trinis, angulari reliquis majore, margine inferiore dente unico subrotundo et lamelloso insigniter instructis. Pedes modice longi, robusti, setosi, pallide luridi, tibiis posticis apice anguste fusco-annulatis.

♂. Long. 2,8 mill. — Cephalothoracis frons paulo altior, in regione oculari crasse crinita. Clypeus altissimus. Area oculorum mediorum subquadrata. Pedes-maxillares luridi, tarso bulboque fusco-ravidis; femore gracili, leviter curvato; patella parva, nodiformi; tibia patella paulo longiore, leviter curvata, apice incrassata et ciliata; tarso magno,

late ovato, apice subacuto, bulbum magnum paulo superante. — Ceylan : Nuwara-Eliya !.

**T. Gabardi**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — A praecedenti, cui affine est, differt cephalothorace obscure fusco nigro, oculis mediis posticis a lateralibus quam inter se remotioribus et area mediorum antice quam postice latiore, abdomen ovato, supra nigro sed in medio late transversim dilutiore et obscure fulvo, vitta media lata sed postice abrupte angustiore et filiformi et prope medium vitta transversa albida crucem formantibus, decorato, subtus nigro, sterno nigro, pedibus robustis et parum longis omnino luridis.

♂. Long. 2,8 mill. — Fronte paulo altiore, pedibus anticis longioribus et aurantiaco tinctis. Pedes-maxillares rufo-castanei; femore gracili; patella parva nodiformi; tibia cupuliformi, sub basin tarsi ampliata et truncata; tarso ovato cum bulbo maximo late ovato.

*Var.* ♀. — Abdomen supra omnino nigrum, albo-marginatum. — Ceylan : Kandy, Nuwara-Eliya, Maturata !.

**T. crispulum**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax luridus, fronte late nigra, vitta dorsali lata sed postice attenuata et subacuta et pone oculos leviter dilutiore notatus. Oculi postici sat minuti, aequi, in lineam vix procurvam, medii a lateralibus quam inter se evidenter remotiores. Oculi medii antici posticis maiores et transversim multo remotiores. Area mediorum latior quam longior et antice quam postice multo latior. Clypeus infuscatus, area oculorum non latior. Chelae et partes oris fuscae. Sternum luridum, postice, inter coxas posticas disjunctas, sat late obtusum. Abdomen magnum, paulo latius quam longius, antice truncatum, postice valde declive et rotundum, antice, in declivitate, vitta transversa lata leviter sinuosa et utrinque vitta marginali, prope apicem ampliata, nigerrimis, notatum, subtus obscure olivaceum, late et confuse nigro-marginatum. Pedes modice longi, pallide luridi, anguste nigro-annulati, femoribus quatuor posticis annulo apicali latiore et laciniioso notatis. — Venezuela : La Guaira !.

**T. struthio**, n. sp. — ♂. Long. 4,8 mill. — Cephalothorax rufescens, coriaceus et transversim subtiliter rugatus, processu frontali digitiformi (cephalothorace toto vix breviore) antice oblique directo, apice abrupte acuminato et penicillato et prope apicem oculos medios anticos gerente, insigniter munitus. Oculi postici, ad basin processu siti, in lineam recurvam, medii inter se anguste distantes sed a lateralibus haud separati. Oculi medii antici a reliquis oculis longissime remoti. Clypeus

altissimus et retro obliquus. Sternum late cordiforme, convexum, rufulum, coriaceum et parce rugosum. Abdomen globosum, album, subtus plaga epigasteris annuloque mamillari fuscis et nitidis munitum. Pedes modice longi, graciles, olivacei, femoribus ad basin sensim dilutioribus, setis erectis sat longis muniti. Pedes-maxillares rufescentes, femore sat gracili, patella convexa, tibia brevi sed subtus ampliata, tarso magno sed apice valde acuminato et bulbum paulum superante. — Venezuela : Caracas !, Tovar !.

A *T. stylifronti* E. Sim., cui sat affine est, imprimis differt processu frontali oculos medios anticos gerente, tegumentis coriaceis et tarso pedum-maxillarium acuminato.

**T. caracasanum**, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax sublaevis, fulvo-rufescens, tenuissime fusco-marginatus, parte thoracica sat late ovata depressiuscula sed parte cephalica valde acclivi et sub-acuminata, area oculorum mediorum antice prominula et valde crinita, prope medium transversim striata et postice, inter oculos, minute gibbosa. Oculi quatuor postici in lineam leviter recurvam, medii inter se quam a lateralibus remotiores. Oculi antici in lineam subrectam, medii minores, inter se distantes sed a lateralibus vix separati. Area oculorum mediorum subparallela et paulo longior quam latior. Clypeus latus planus. Chelæ clypeo longiores, sat validæ, ungue longo. Abdomen breviter ovatum, albidum, supra postice maculis nigris obliquis binis ornatum, subtus plaga epigasteris nigra munitum. Sternum late cordiforme, subtilissime coriaceum, fulvo-rufescens, tenuissime fusco-marginatum. Pedes mediocres, sat graciles, olivacei, coxis femoribusque ad basin dilutioribus, setis erectis sat longis muniti. Pedes-maxillares fulvi, femore sat longo et robusto, patella cylindracea, tibia brevissima sed subtus ampliata, tarso bulboque ovatis. — Venezuela : Caracas !.

**T. lobifrons**, n. sp. — ♂. Long. 1,7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, antice late et obtuse truncatus, lobo frontali parvo oculos medios posticos inter se contiguos gerente, utrinque stria divaricata discreto et postice minute biimpresso, munitus. Area oculorum mediorum maxima multo longior quam latior et antice quam postice multo latior, pilosa et sub oculis mediis posticis carinula transversa semilunari munita. Oculi laterales utrinque contigui, a mediis late remoti. Oculi quatuor antici (antice visi) in lineam leviter recurvam, medii inter se quam a lateralibus remotiores. Clypeus altissimus valde retro obliquus. Sternum latissime cordiforme, laeve, convexum, fulvum. Abdomen globosum albidum, subtus plaga epigasteris fulvo-nitida munitum. Pedes

modice longi, graciles, fulvi, setis erectis longis muniti, metatarsis 1<sup>i</sup> paris sat crassis, curvatis, apice valde attenuatis. Pedes-maxillares fulvi, femore gracili subrecto, patella brevi leviter convexa, tibia brevissima sed subitus ampliata, tarso bulboque ovatis. — Venezuela : Caracas, Colonia Tovar !.

**T. gibbithorax**, n. sp. — ♂. Long. 4,7 mill. — A praecedenti, cui affine est, differt parte thoracica, pone lobum frontalem, valde gibbosa, clypeo latissimo et valde prominulo, area oculorum mediorum maxima valde obliqua, pilosa, haud carinata, oculis quatuor anticis (antice visis) inter se fere æquidistantibus, metatarsis anticis teretibus nec incrassatis nec curvatis. — Venezuela : Colonia Tovar !.

**Sphyrotinus bimucronatus**, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax ovatus, longior quam latior, anticè parum attenuatus, fronte lata, laevis, pallide luteus, regione thoracica in medio confuse infuscata. Oculi postici magni, inter se anguste et fere æque distantes, medii lateralibus paulo maiores et ovati. Oculi antici in lineam rectam, inter se valde inæquales, medii lateralibus plus duplo minores. Abdomen magnum, latius quam longius, antice sat angustum et cephalothorace haud obtectum, sed postice validissime ampliatum, truncatum cum angulis productis obtusis et leviter curvatis, supra albo-opacum, fulvo-reticulatum, subitus in medio luteum in lateribus infuscatum et albo-plagiatum. Chelæ, sternum pedesque pallide lutea, hi graciles et longi. — Venezuela : San-Esteban !.

**Hypobares unisignatus**, n. sp. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax brevis, antice valde elevatus, fere *Dipanax*, pallide flavus, laevis et nitidus. Area oculorum nigra. Oculi inter se valde appropinquati. Quatuor postici in lineam levissime procurvam (subrectam), medii lateralibus paulo maiores et inter se remotiores sed spatio interoculari oculo angustiore. Oculi antici in lineam procurvam, medii lateralibus plus duplo maiores inter se distantes sed a lateralibus haud separati. Area mediorum subquadrata. Clypeus altissimus verticalis, leviter depresso et pilosus. Chelæ, partes oris sternumque lurida. Chelæ clypeo multo breviores. Sternum inter coxas posticas late obtusum. Abdomen breviter ovatum, albidum, supra ad apicem, macula nigra subrotunda ornatum, subitus leviter fusco-reticulatum et regione epigasteris leviter convexa infuscata. Pedes pallide olivacei, femoribus ad basin coxisque dilutioribus, longe setosi, femoribus 2<sup>i</sup> paris extus ad apicem aculeis trimis uniseriatis insigniter armatis. Pedes-maxillares luridi, tarso bulbo-

que rufulo-tinctis, patella parva, tibia brevissima cupuliformi, tarso bulboque maximis late ovatis. — Venezuela : San-Esteban !.

**Achæa quadripunctata**, n. sp. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax flavo-rufulus, laevis, parte thoracica fovea vel sulco transverso impressa. Oculi postici magni, inter se æque et sat anguste separati, medii lateralibus majores subrotundi. Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus majores et prominuli. Abdomen convexum, subglobosum, albo-testaceum, ad marginem anticum maculis duabus elongatis et obliquis et postice punctis duobus nigerrimis decoratum, subtus plagula epigasteris fulvo-nitida munitum. Sternum flavo-rufescens, nitidum, subtiliter coriaceum. Pedes sat longi, femoribus, præsertim anticus, robustis, valde inæquales, antici reliquis multo longiores, sat longe setulosi, pallide testacei, subpelluentes, femoribus rufescensibus. Pedes-maxillares fulvo-ravidi, breves, sat robusti; patella minuta subquadrata; tibia patella fere æquilonga; tarso longe ovato; bulbo ovato ad apicem stylo brevi et uncato munito. — Brasilia : Caraça (prov. Minas) (Gounelle).

**Philto subtilis**, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax albo-testaceus, laevis et nitidus, setis longis paucis conspersus, area oculorum nigra, maculam semilunarem formante. Abdomen ovatum, convexum, albo-testaceum, subpellucens, setis albis rigidis longis parce hirsutum. Sternum albo-testaceum, nitidum. Pedes, præsertim anticus, longi, luridi, sat longe hirsuti. Pedes-maxillares breves, albidi, tarso bulboque infuscatis; femore robusto, brevi et curvato; patella convexa, supra seta longa munita; tibia brevi, secundum basin tarsi, oblique dilatata; tarso bulboque sat longe ovatis. — Africa orient. : Zanzibar.

**Dipœna cyclosoides**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, sublaevis, versus marginem leviter punctato-rugosus. Oculi fere *Dipœna melanogasteris*, medii postici a lateralibus quam inter se multo remotiores. Clypeus chelis paulo angustior. Sternum fuscum, valde coriaceo-reticulatum. Abdomen breve, supra in processum erectum, leviter attenuatum, apice truncatum et obtuse quadrifuscum, altissime elevatum, fusco-testaceum, breviter pilosum et parce albo-punctatum. Pedes sat longi, fulvi, pallide luteo-annulati, brevissime pilosi.

♂. Long. 1,9 mill. — Cephalothorax nigricans, coriaceus, impressione thoracica profundissima semicirculari impressus, fronte valde prominula in processum oculiferum longum et apice truncatum producta. Clypeus valde depresso, chelis parvis plus triplo latior. Sternum nigrum, coriaceum, antice et utrinque leviter inaequale. Abdomen anguste elongatum, haud elevatum, sed postice paululum productum et obtusum, nigrum, sat longe albo-pilosum et vitta dorsali dilutiore ornatum. Pedes olivacei, leviter luteo-variati, patellis tibiisque quatuor anticis luteis. Pedes maxillares nigri; femore gracili et longo; patella parva; tibia cupuliformi; tarso bulboque maximis et cylindraceis. — Africa occid. : Sierra-Leone.

**Hyocrea implexa**, n. sp. — ♀. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax nitidus, fusco-rufescens, versus marginem leviter nigro-variatus. Abdomen subrotundum, antice obtuse truncatum, et supra leviter deplanatum, fusco-piceum, postice, in declivitate, macula magna albido-testacea, notatum, supra crebre impresso-punctatum et setis pronis flavidonitidis vestitum, subtus dilutius, regione epigasteris rufula et coriacea. Sternum fusco-rufescens, laeve et nitidum. Pedes omnino flavo-aurantiaci, tarsis sat robustis metatarsis multo longioribus. — Venezuela : San-Esteban !.

**Sympagia oreophila**, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax laevis, obscure fuscus, vitta media latissima nigra notatus. Abdomen magnum, ovatum, antice obtusissime truncatum, postice leviter productum et obtusum, supra rufo-lividum, minute et creberrime punctato-rugosum et sat dense fulvo-hirsutum, maculis nigris, magnis, subrotundis sex, biseriatis (3-3) ornatum, postice, in declivitate, et subtus omnino nigrum. Sternum nigro-nitidum. Pedes luridi. — Ceylan : Nuwara-Eliya !.

**Ulesanis pilula**, n. sp. — ♀. Long. 2,2 mill. — Cephalothorax luridus, late rufescenti-marginatus, parte cephalica valde acclivi, attenuata et prominenti, apice recte truncata. Oculi postici in lineam valde recurvam, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores et spatio interoculari oculo fere quadruplo latiore. Oculi antici in lineam rectam seu leviter recurvam, medii lateralibus paulo maiores et inter se paulo remotiores. Area mediorum multo latior quam longior et antice quam postice angustior. Abdomen maximum, globosum, cephalothorace obtecum, in medio humillime et obtusissime bituberculatum, supra albo-

testaceum, antice in declivitate nigro-marginatum, vitta media, apicem haud superante, et utrinque vitta sinuoso-angulosa cinereis notatum, subtus nigro-violaceum. Sternum nitidum, fusco-rufescens. Pedes pallide luridi. — Zanzibar (Raffray).

**U. capensis**, n. sp. — ♀. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, anguste nigro-marginatus, brevissimus, parte cephalica convexa, antice late obtusa et parum prominenti. Oculi quatuor medii aream circiter aequa longam ac latam et antice quam postice paulo latiore occupantes, antici posticis majores. Oculi laterales a mediis late remoti. Abdomen maximum, subrotundum, in medio tuberculo obtuse-turbinate munitum, lurido-nitescens, antice, in declivitate, vitta confusa infuscata, notatum, crebre et grosse impresso-punctatum, subtus antice infuscatum et postice annulo mamillarum rufo-brunneo. Sternum fuscum, coriaceum, postice subacutum. Pedes pallide fulvo-olivacei.

♂. Long. 1 mill. — Cephalothorax altior, parte cephalica postice convexiore, antice magis declivi et prominentiore. Oculi laterales a mediis latissime distantes. Abdomen paulo minus. Pedes-maxillares luridi, tarso bulboque infuscatis; femore brevi et gracili; patella parva nodosa; tibia patella multo majore, longiore et plus duplo latiore, supra visa subquadrata; tarso maximo, reliquis articulis cunctis longiore, arcuato-reniformi et bulbum parum superante; bulbo reniformi, stylo recurvo munito. — Cap. Bonæ-Spei !.

**U. eburnea**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax fulvus, fusco-marginatus, brevissimus, fronte obtusa et parum prominenti. Oculi medii inter se quam a lateralibus multo remotiores, aream multo latiorem quam longiorem et antice quam postice angustiorem occupantes, antici posticis majores. Abdomen maximum, cephalothorace omnino obiectum, sinuoso-rotundum et ad marginem anticum obtusissime prominulum, sed leviter inaequale, supra omnino albo-eburneum, minutissime et parcissime impresso-punctatum et punctis ocelliformibus ordinariis, leviter foveolatis, munitum, postice, in declivitate, valde transversim plicatum et nigro-striatum, subtus regione mamillari late nigra. Sternum fuscum sublaeve. Pedes flavo-rufuli. — Transvaal !.

**U. bifrons**, n. sp. — ♀. Long. 2,8 mill. — Cephalothorax fulvus, brevissimus, regione frontali valde prominula, angusta et tuberculiformi, apice acute bicornuta. Oculi inter se appropinquati, laterales a mediis haud separati, medii antici reliquias majores, inter tubercula

frontalia siti. Abdomen maximum, cephalothorace omnino obtectum, paulo longius quam latius, antice prominulum et truncatum, utrinque sinuosum, postice sensim ampliatum et truncatum, tuberculis mediis latis sed humillimis munitum, supra pallide flavidum minutissime punctatum, punctis ocelliformibus ordinariis munitum, subtus in regione epigasteris et mamillarum infuscatum. Sternum luteum, parce impresso-punctatum. Pedes pallide luridi. — Ins. Philippinæ : Quingua !.

*U. nasuta* Cambr. sat affinis sed differt imprimis fronte bicornuta.

**Gnophomytis variolosa**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax nigro-castaneus, punctis impressis magnis crebre variolosus, pilis albidis sat longis vestitus, fronte sat lata et truncata. Oculi postici magni, æqui, anguste et fere æque separati, in lineam plane rectam. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii a lateralibus haud separati, maiores et valde prominuli. Area mediorum circiter æque longa ac lata et antice quam postice latior. Abdomen magnum, subrotundum, paulo latius quam longius, supra fusco-castaneum, crebre et grosse impresso-punctatum. Sternum magnum, grosse sed parce impresso-punctatum, postice late obtusum, haud sulcatum. Pedes fulvo-rufuli. — Venezuela : San-Esteban !.

**Virada rugithorax**, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, vitta media latissima dilutiore notatus, lævis et nitidus, sed in lateribus et in medio granulis grossis nigris conspersus. Abdomen subrotundum, scuto dorsali nitidissimo, pilis albidis parce vestito et punctis impressis sat minutis quatuor (trapezium æque longum ac latum designantibus), munitum, nigro-castaneum, in medio confuse dilutius, subtus albidum, scuto epigasteris scutoque mamillari rufescens-tibus notatum. Sternum rufescens, parce et grosse nigro-rugosum. Pedes breves, obscure fulvi. Pedes-maxillares breves; patella tibiaque brevissimis; tarso mediocri, ovato; bulbo stylo apicali semicirculari, instructo. — Venezuela : San-Esteban !.

**V. tovarensis**, n. sp. — ♂. Long. 1,4 mill. — A præcedenti differt magnitudine minore, cephalothorace sternoque omnino fusco-castaneis, hoc creberrime granuloso, regione frontali convxiore et area oculorum mediorum multo majore, pedum-maxillarium maris tarso majore. — Venezuela : Colonia Tovar !.

**Histogramia deserticola**, n. sp. — ♂ ♀. Long. 2 mill. — Cepha-

lothorax laevis, rufescens, versus marginem sensim infuscatus, processu frontali humili et obtusissimo. Abdomen ovatum, parum convexum, scuto dorsali sublaevi, sed punctis impressis setiferis consperso, atro, maculis magnis quatuor maculaque apicali obscure testaceis, ornato. Sternum nigro-rufescens, nitidum. Pedes fusco-rufescentes, femoribus ad basin, trochanteribus coxisque, metatarsis tarsisque dilutioribus et luteis. Pedes-maxillares feminæ fusi, maris rufescentes, tibia cupuliformi intus seta uncata munita, tarso magno apice acute dentato. — Africa austr. : Bechuanaland !.

**Mysmena conica**, n. sp. — ♂. Long. 1 mill. — Cephalothorax brevis, altus, fulvo-olivaceus, regione frontali nigra. Oculi postici in lineam levissime recurvam, inter se fere æquidistantes, medii laterilibus paulo maiores. Abdomen breve, supra obtuse productum et turbinatum, obscure fulvum, maculis parvis albis quatuor et postice, in declivitate, macula alba maxima et ovata, ornatum, regione ventrali infuscata. Sternum pedesque obscure fulvo-olivacea. Pedum-maxillarium tarsus bulbusque magni, stylo libero spirali muniti. — Algeria : Edough !.

**M. illectrix**, n. sp. — ♂. Long. 1 mill. — Cephalothorax brevis et altissimus, fulvo-olivaceus, postice sensim dilutior, tenuissime nigro-marginatus. Oculi postici in lineam evidenter recurvam, medii paulo maiores et inter se quam a lateralibus vix remotiores. Abdomen globosum, cinereum, supra confuse albo-plagiatum, postice, in declivitate, vitta lata albida, late nigro-marginata et tenuiter nigro-clathrata, ornatum. Sternum fulvum, antice vittis duabus divaricatis, postice vitta marginali fuscis ornatum. Pedes fulvo-olivacei vix distincte annulati. Pedum-maxillarium tarsus bulbusque maximi, fere *M. leucoplagiatæ*, stylo terminali spirali muniti. — Ins. Philipp. : Manila !.

**M. saltuensis**, n. sp. — ♀. Long. 1 mill. — Cephalothorax brevis, obscure fulvo-olivaceus, lineis binis longitudinalibus, linea marginali et utrinque lineis radiantibus abbreviatis nigris ornatus. Oculi postici in lineam rectam, medii a lateralibus quam inter se remotiores. Abdomen magnum, globosum, obscure fulvum, crebre nigro-reticulatum, supra maculis albis biseriatis sex (3-3), quatuor anticis majoribus, et utrinque maculis albis minoribus binis ornatum, postice in declivitate et subtus vitta latissima fulva, transversim tenuiter fusco-striata, notatum. Sternum olivaceum in medio dilutius. Chelæ olivaceæ apice infuscatae.

Pedes lurido-olivacei, femoribus tibiis metatarsisque ad apicem nigricanti-annulatis. — Ceylan : Matale !

**Ancocœlus livens**, n. sp. — ♀. Long. 5,5 mill. — Cephalothorax sublaevis, late rufescens, anguste nigro-marginatus. Oculi postici magni, æqui, in lineam sat recurvam, inter se anguste et æque distantes. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus minores. Area mediorum antice quam postice paulo angustior. Abdomen magnum, convexum et breviter oblongum, nigro-testaceum, nitidum, supra, prope medium, maculis albis parvis binis, transversim late remotis et postice serie media macularum parvarum albarum subtriquetralium 2 vel 3 ornatum, subtus in medio confuse dilutius. Sternum pedesque fulvo-rufescens, femoribus, præsertim anticis, apice late infuscatis. — Tasmania : Launceston (Simson).

**Taphiassa punctigera**, n. sp. — ♂. Long. 2,6 mill. — Cephalothorax sat longe oblongus, fusco-castaneus, coriaceus, versus marginem subtiliter rugosus et in medio transversim rugatus. Area oculorum mediorum antice quam postice latior. Oculi antici in lineam subrectam, medii lateralibus paulo majores. Abdomen breviter ovatum, postice acuminatum, nigro-nitidum, parce albo-setosum et supra punctis albis minutis quatuor ornatum, ad apicem, prope mamillas, sensim dilutius. Sternum fusco-rufescens, valde coriaceo-reticulatum. Pedes fusco-rufescentes, longi et graciles, sat longe setosi. Pedes-maxillares rufescentes, sat parvi; femore brevi et gracili; patella parva et nodosa; tibia brevissima, cupuliformi; tarso magno, late ovato et acuminato; bulbo magno. — Ceylan : Matale !.

#### Familia ARGIOPIDÆ (1).

**Prionolæma ætherea**, n. sp. — ♂ (pullus). Long. 9 mill. — Cephalothorax, sternum, chelæ, partes oris pedesque pallide lurida, parte cephalica vittis duabus obscurioribus evanescentibus notata, oculis tenuiter nigro-cinctis. Abdomen angustissimum et longissimum in caudam rectam et subacutam productum, pallide testaceum, supra vittis duabus argenteo-punctatis decoratum. Pedum anticorum tibiae intus, metatarsi et intus et extus setis spiniformibus numerosissimis et regulariter uniseriatis muniti. — Venezuela : Colonia Tovar !.

(1) Pour les genres *Prionolaema*, *Atelidea*, *Mecynometa*, *Atimiosa* et *Xylethrus*, cf. E. Simon, Hist. nat. des Araignées, 2<sup>e</sup> éd., fasc. III et IV.

**Glenognatha Gaujoni**, n. sp. — ♂. Long. 4,2 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, ad marginem leviter infuscatus, et vitta media obscuriore, antice evanescente, notatus, oculi singulariter nigro-cincti. Area oculorum mediorum antice quam postice angustior, medii postici anticis saltem 4/3 maiores. Abdomen ovatum, obscure testaceum, arcubus transversis angulosis obscurioribus notatum, parce pilosum. Chelæ fulvæ, læves, longæ, porrectæ et divaricatae, margine superiore dentibus binis (1<sup>o</sup> majore, 2<sup>o</sup> submedio) margine inferiore dentibus 3 vel 4 (primo longissimo, antice directo, 2<sup>o</sup> minore recto, reliquis multo minoribus), ungue longissimo, validissime curvato, subplicato. Pedes longi et graciles, obscure luridi. Pedes-maxillares luridi, graciles et longi; tibia patella longiore, versus apicem leviter ampliata; tarso angusto, leviter curvato, tibia cum patella haud breviore, bulbo haud obtecto; lobo bulbi maximo, depressiusculo, fulvo-nitido; apophysi apicali nigra, ad basin spirali, dein subrecta et apicem tarsum attingente. — Ecuador meridionalis : Loja (Gaujon).

A G. Emertoni E. Sim., cui valde affinis est, præsertim differt oculis mediis posticis majoribus et pedibus longioribus.

**Atelidea spinosa**, n. sp. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger. Oculi postici in lineam subrectam, medii lateralibus multo maiores, a lateralibus quam inter se vix remotiores et spatio oculo paulo angustiore a sese distantes. Oculi laterales utrinque valde prominuli. Abdomen breviter ovatum, sat angustum, fulvo-olivaceum, parce albo-punctatum, supra in parte basali utrinque vitta longitudinali lata et incurva lineaque media abbreviata, postice leviter ampliata et truncata, in medio utrinque linea transversa exili et postice macula magna obtuse triquetra, subtus vitta media integra postice acuminata et utrinque maculis magnis binis, altera pone spiraculum, altera prope mamillas, nigris, ornatum. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Chelæ robustæ et divaricatae. Pedes flavidi, coxis trochanteribusque 1<sup>i</sup> paris fuscis, femoribus, præsertim anticis, longe et numerose aculeatis (fem. 1<sup>i</sup> paris intus 6, extus 4, supra 2 aculeatis) tibiis parcis aculeatis (aculeo basali superiore longissimo), metatarsis 1<sup>i</sup> paris subtus in parte basali spinulis seriatis quinque armatis. Pedes-maxillares pallide lutei; trochantere femoreque longis et gracillimis; tibia gracili, patella multo longiore et versus basin attenuata; tarso angusto, ovato, ad basin aculeo superiore recto erecto et acutissimo ramuloque exteriore parvo gracili sed obtuso instructo; bulbo ovato, simplici. — Ceylan : Cottawa prope Galle!.

**Mecynometa gemmata**, n. sp. — ♀. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax luteus. Oculi postici in lineam leviter procurvam, magni, medii lateralibus majores, rotundi, spatio oculo angustiore a sese distantes. Abdomen breve, convexum, postice obtusissime truncatum, cinereo-testaceum, supra parce et inordinate argenteo-guttulatum, postice, in declivitate, obscurius et maculis argenteis binis majoribus subrotundis, subtus, prope rimam, maculis similibus binis, inter se appropinquatis, decoratum. Sternum pedesque fulvo-olivacea, coxis femoribusque ad basin dilutioribus (pedes 3<sup>i</sup> paris reliquis obscuriores). Pedes longissimi, aculeis setiformibus paucissimis armati et femoribus 4<sup>i</sup> paris serie setarium longissimarum extus munitis. Plaga vulvae mediocris, transversa, utrinque nigra, in medio fulva et deppressa. — Venezuela : San-Esteban !.

**M. scintillans**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax obscure luteus. Oculi postici in lineam valde procurvam, medii ovati, inter se quam a lateralibus remotiores et spatio oculo latiore a sese distantes. Abdomen subglobosum, atro-cinereum, supra creberrime argenteo-punctatum, vitta media obscuriore ramosa notatum, postice utrinque macula majore ovata et obliqua et subtus, pone rimam, macula maxima transversa argenteis, decoratum. Sternum pedesque fulvo-olivacea, coxis femoribusque ad basin dilutioribus. — Le Para.

**Azilia histrio**, n. sp. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax niger, flavidio-pilosus, parte cephalica saepe paulo dilutiore, parte thoracica vittis binis abbreviatis et postice vitta media subtriquetra albido-testaceis, notata. Oculi antici in lineam leviter procurvam. Clypeus oculis mediis anticis latior, sub oculis leviter depresso. Abdomen longius quam latius, antice rotundum, postice valde attenuatum et leviter productum, nigrum vel fuscum, parum dense fulvo-pilosum, parce testaceo-punctatum, antice arcu sinuoso testaceo marginatum, prope medium lineis transversis binis sinuosis et valde recurvis ornatum, subtus nigricans, testaceo-variatum et lineis fulvis binis remotis, marginatum. Sternum coriaceum, nigrum vel fuscum, testaceo-maculatum. Partes oris fuscae, intus late testaceo-marginatae. Pedes luridi, coxis cunctis fusco-unimaculatis, femoribus annulis tribus latissimis et sinuosis fuscis et nigro-marginatis (in femoribus anticis partibus luridis multo latioribus) notatis, patellis nigricantibus anticis annulo subbasiliari lurido ornatis, tibiis anticis ad basin atque ad apicem late annulatis et ante

medium annulo angusto et sinuoso (cum basilari sœpe confluenti) nigricantibus notatis, metatarsis cunctis triannulatis, tarsis obscure fulvis basi dilutioribus. Vulva simplex, fovea minuta transversa et ovata, impressa et postice margine rufula arcuata limitata. — Venezuela : San-Esteban ! — Brasilia : Le Para (de Mathan).

**A. Rojasí**, n. sp. — ♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax fuscus, parte cephalica vitta media paululum lanceolata vittisque lateralibus, postice divaricatis, obscure testaceis et parum expressis, parte thoracica vitta testacea latissima, antice maculam fuscam oblongam parvam includente, notatus. Oculi antici in lineam leviter recurvam. Clypeus oculis mediis anticis haud latior. Abdomen longius quam latius, convexum, postice breviter attenuatum et obtusum, obscure cinereum, nigricantireticulatum, antice parce albido-punctatum. Sternum nigrum, antice vitta parva et abbreviata ferruginea notatum. Pedes luridi, femoribus annulis trinis latis fuscis, tibiis metatarsisque annulo medio annuloque apicali latis nigricantibus, patellis infuscatis, tarsis basi luridis apice fuscis. Vulva fere præcedentis. — Venezuela : Caracas !.

**A. Boudeti**, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — A præcedentibus, cui affinis est, differt oculis anticis in lineam plane rectam, inæqualibus, mediis lateralibus saltem  $\frac{1}{3}$  minoribus, et area oculorum mediorum longiore quam latiore. Cephalothorax fusco-rufescens, area oculorum late nigra, parte cephalica et thoracica antice dilutioribus et fulvis sed haud vittatis. Abdomen longius quam latius, convexum, postice breviter attenuatum atque obtusum, obscurum, testaceo-punctatum, supra late nigricanti-variatum et antice vitta media fulva apice valde trifida ornatum. Sternum obscure fuscum, macula media parva dilutiore notatum. Pedes luridi, coxis patellisque fuscis, femoribus, tibiis metatarsisque annulo medio annuloque apicali fuscis nigrisve ornatis, tarsis obscure fulvis. Vulva fere præcedentium. — Brasilia : Rio.

**A. vagepicta**, n. sp. — ♀. Long. 11 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, oculis nigro-marginatis, parte cephalica, pone oculos, linea testacea parva V formante, parte thoracica vittis latis testaceis parum remotis, antice divaricatis, extus lobatis, notatis. Oculi antici in lineam evidenter recurvam. Clypeus oculis mediis anticis haud latior. Abdomen ovatum, postice valde attenuatum, fusco-lividum, parce testaceo-punctatum, lineis transversis arcuatis, punctatis et interruptis et postice,

supra mamillas, macula testacea subtriquetra, notatum, subtus vitta latissima subquadrata flavescenti-opaca et nigricanti limbata, ornatum. Sternum nigrum, subtiliter coriaceum, opacum. Chelæ fusco-rufulæ, lœves, nitidæ; margine inferiore sulci dentibus quatuor aequis et contiguis, margine superiore dentibus tribus, paulo remotioribus, medio aliis majore, instructis. Partes oris pedesque ut in praecedenti sed tibiis cunctis late biannulatis. Area vulvæ simplex, postice rufescens, nitida, sulcis duobus convergentibus et foveis binis punctiformibus, notata. — Amer. sept. : Georgia.

**Atimiosa quinquemucronata**, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, parte cephalica vitta lata et sinuosa, V magnum formante, marginata, maculis mediis parvis binis subgeminatis nigricantibus maculisque ocularibus magnis intense nigris ornata, parte thoracica utrinque vitta marginali dentata maculaque media cordiformi nigricantibus, notata. Abdomen atro-cinereum, breviter fulvo-pubesces, antice rotundum, postice valde declive et attenuatum, supra tuberculis obtusis quatuor, trapezium magnum designantibus, tuberculoque subapicali, instructum. Sternum fulvum, maculis lateralibus, macula media et postice linea abbreviata nigricantibus, notatum. Pedes robusti, fulvi, late et numerose fusco-olivaceo-annulati, aculeis longis subpellucentibus instructi. — Ceylan : Nuwara-Eliya !.

**Gea africana**, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax luridus, crasse albido-pilosus, parte cephalica postice dilutiore et vitta fusca lata, V magnum formante, limitata, oculi cuncti nigro-cincti. Area mediorum paulo longior quam latior, oculi postici anticis majores. Oculi laterales prominuli, anticus minutissimus postico plus triplo minor. Clypeus retro obliquus, oculis anticis latior. Abdomen breve, antice obtusissime truncatum, subrotundum, postice leviter ampliatum et rotundum, in parte prima luridum, in parte altera fuscum, omnino parce luteo-punctatum, inferne obscure testaceum et utrinque maculis parvis et inordinatis luridis marginatum. Sternum fusco-testaceum, vitta media et utrinque maculis elevatis tribus opaco-luridis, notatum. Chelæ et partes oris fulvae. Pedes breves et robusti, luridi, femoribus late fusco-maculatis, inferne fere omnino fuscis, tibiis ad apicem latissime infuscatis, aculeis nigris longis et numerosis fere ut in *G. præcincta* dispositis. Vulvæ tuberculum fusco-nitidum, triquetrum, paulo latius quam longius, antice reste sectum, postice carina latissima convexa et utrinque fovea obliqua impressum. — Congo : Landana.

**Cyrtophora larinoides**, n. sp. — ♀. Long. 43 mill. — Cephalothorax longus, fulvus, breviter et dense albo-pubescent. Area oculorum mediorum multo longior quam latior sed antice quam postice latior, oculi laterales utrinque spatio oculo haud angustiore a sese distantes. Clypeus oculis anticis haud latior. Abdomen longissimum, fere parallelum, sed antice prominulum et subacuminatum, postice truncatum et vix bilobatum, supra fulvum, lineis binis sinuosis fuscis angustis et parum expressis notatum, subtus paulo obscurius et punctis albidis quatuor, quadratum designantibus, notatum, regione epigasteris nigra. Sternum fuscum. Pedes fulvi, femoribus, patellis tibiisque subtus valde infuscatis subnigris sed annulo submedio lato dilutiore notatis. Aculei numerosissimi. Metatarsi graciles tibiis paulo longiores. Tuberculum vulvæ valde plicatum, postice abrupte angustius, breve et truncatum. — Africa occid. : Ogoué.

**C. sexnotata**, n. sp. — ♀. Ceph.th., long. 8,3 mill. Abd., long. 17 mill.; lat. 8,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, crasse et longe albido-crinitus, antice regione frontali, postice parte thoracica paulo obscurioribus et rufulo-tinctis. Area oculorum mediorum subparallelia. Spatium inter oculos laterales oculo duplo latius. Abdomen maximum, multo longius quam latius, antice paulum prominens et rotundum, postice leviter attenuatum, obtuse et breviter productum, supra nigrum obscure rufulo-cervino-pubescent et maculis parvis niveis sex biseriatis ornatum, maculis anticis elongatis, reliquis punctiformibus, subtus nigrum utrinque vitta fulva arcuata et abbreviata marginatum. Sternum fuscum, in medio vix distincte testaceo-bipunctatum. Partes oris fuscae, intus testaceo-marginatae. Chelæ fulvo-rufulæ, margine inferiore sulci quadridentato, dente apicali reliquis minore. Pedes robusti et breves, obscure fulvi, patellis fuscis, reliquis articulis late et numerose nigricanti-annulatis. Tuberculum vulvæ transversum et truncatum, utrinque parte testacea semicirculari superne profunde foveolata et unco medio brevissimo testaceo et obtuso notatum. — Brasilia : Teffe (prov. Amazonas) ; Peru : Iquitos.

**C. (Evetria) sellata**, n. sp. — ♀. Ceph.th. long. 5,8 mill. Abd. long. 12 mill., lat. 6,7 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, crasse et longe albido-crinitus, parte cephalica, in medio, thoracica, ad marginem, leviter infuscatis. Area oculorum mediorum antice quam postice paulo latior. Spatium inter oculos laterales oculum haud superans. Abdomen subpa-

rallelum, antice verticale, altissimum, postice longe declive, apice excavatum et obtuse bituberculatum, flavo-cervinum, sericeo-pubescent, ad apicem, inter tubercula, macula nigra magna rhomboidali ornatum, in declivitate punctis impressis fuscis biseriatis notatum, subtus infuscatum. Sternum fuscum, macula media dentata dilutiore notatum. Partes oris fuscae, intus testaceo-marginatae. Chelae obscure fulvo-rufulæ. Pedes parum longi, robusti, fulvi, femoribus annulis binis, patellis annulo apicali, tibiis metatarsisque annulo subbasilari atque apicali olivaceis, et tibiis quatuor anticis annulo apicali latiore intense nigro ornatis. Tuberculum vulvae simplex, semicirculare, elevatum, apice obtusum et in medio leviter depresso, unicus haud perspicuus. — Ins. Santo Domingo.

**C. Nympha**, n. sp. — ♀ (pullus). Long. 13—15 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, crasse et longe albido-pilosus. Area oculorum mediorum subparallelia (antice vix latior). Oculi quatuor antici in lineam valde recurvam. Spatium inter laterales oculo paulo latius. Clypeus oculis mediis anticis angustior. Abdomen longum, teretiusculum, antice prominens cum angulis humeralibus obtusissimis sed distinctis, postice longe declive, attenuatum et obtusum, supra fulvo-cervinum vel lividum, lineolis binis longitudinalibus exillimis et sinuosus dilutioribus notatum, subtus atrum vel fusco-rufescens utrinque vitta arcuata flava marginatum, et in medio maculis latis et obliquis fulvis notatum. Sternum nigrum vel fusco-olivaceum. Partes oris atræ, intus crasse albido-marginatae. Chelae laeves, nitidae, fulvae, ad basin atque ad apicem leviter infuscatae. Pedes parum longi, robusti, fulvi; femoribus, tibiis metatarsisque late fusco vel olivaceo biannulatis, tarsis, basi excepto, infuscatis. — Venezuela : San Esteban !

**C. grammica**, n. sp. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, parce et longe albido-pilosus, parte cephalica lineis trinis obscurioribus evanescentibus, parte thoracica vitta marginali latissima et dentata fusco-rufula, notatis. Abdomen teretiusculum, antice posticeque vix attenuatum et rotundum, nigro-sericeum et, praesertim antice, crebre albido-punctatum, supra lineis longitudinalibus quatuor albis, nigro-marginatis, antice (praesertim mediis) sinuosus, dein recte parallelis, in lateribus linea simili sed obliqua et abbreviata, subtus nigricans, lineis albis rectis, postice interruptis, marginatum. Sternum obscure fusco-rufescens. Chelae fulvo-rufulæ, laeves. Partes oris olivaceæ, intus testaceo-marginatae. Pedes fulvo-olivacei, valde fusco-olivaceo-annulati

et femoribus anticis superne fusco-lineatis. Tuberculum vulvæ rufulum, semicirculare, antice paulum convexum et pilosum, postice planum seu depresso, apice mucronibus binis obscure rufis, contiguis et subglobosis sed intus truncatis, notatum. — Brasilia : Le Para. — Peru : Pebas, Tarapoto (Rio Mayo).

**Carepalxis camelus**, n. sp. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax altissimus, postice abrupte, antice oblique declivis, apice sulcatus, late et obtusissime bilobatus, fulvo-rufescens, subtiliter rugosus et pilis crassis ovatis fulvo-nitidis vestitus. Oculi medii subæquales. Clypeus in medio area oculorum haud angustior. Abdomen breviter ovatum, antice abrupte elevatum atque obtusum, postice valde declive, antice fuscum, supra fulvum, pilis brevibus albis, flavis nigrisque marmoratum, punctis impressis nigris, elongatis et obliquis notatum, subtus macula nigra, maxima, et triquetra obtectum. Chelæ fulvæ, ad basin olivaceæ, crasse flavidæ-pilosæ. Sternum, pedes-maxillares pedesque lurida, femoribus anticis infuscatis, aculeis pedum cunctis sat brevibus, præsertim in metatarsis numerosis, fuscis et pellucentibus vel nigris. Vulvæ uncus fulvus, sat gracilis et longus, medium ventris superans, superne apice canaliculatus. — Paraguay (Germain).

**C. salobreensis**, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax fere præcedentis sed paulo angustior, fuscus, pilis brevissimis fulvo-nitidis vestitus. Area oculorum mediorum non multo latior quam longior. Oculi medii postici anticis paulo majores. Clypeus verticalis planus, area mediorum haud angustior. Abdomen fere præcedentis, fulvum, antice in declivitate fuscum, supra late infuscatum, pilis brevibus albis fulvisque marmoratum, subtus late nigrum. Chelæ nigricantes, in medio late dilutiores. Sternum fuscum, macula media fulva maxima et utrinque dentata obtectum. Pedes luridi; femoribus ad apicem, patellis tibiisque superne infuscatis, aculeis numerosis fulvis iniquis, aculeis interioribus tibiae 1<sup>i</sup> paris et exterioribus tibiae 2<sup>i</sup> paris reliquis aculeis multo longioribus (vulva haud plane adulta). — Brasilia : Rio Salobro (E. Gouuelle).

**Xylethrus trifidus**, n. sp. — ♀. Long. 3,2 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte thoracica declivi obscuriore, subtiliter coriaceus, pilis crassis albis flavidisque mixtis ornatus. Frons utrinque, pone oculos laterales, leviter depressa. Area oculorum mediorum latior quam longior et antice quam postice paulo angustior, oculi medii postici

anticis fere 1/3 maiores. Abdomen paulo latius quam longius, altum, sed supra planum atque excavatum, antice rotundum et parte thoracica obtectum, postice truncatum, tuberculo medio subacuto, tuberculisque lateralibus, angulos occupantibus, turbinatis et pluridentatis armatum, supra rufescens, parce fulvo-nitido pilosum, fere ut in *X. scrupeo* ocellatum, subtus obscure fusco-rufescens. Sternum et chelæ fusco-rufescentia, sternum valde coriaceum, chelæ subtiliter coriaceæ. Pedes brevissimi sed robusti, fulvi, femoribus infuscatis, tibiis metatarsisque fusco-annulatis. — Paraguay (Germain).

**X. superbus**, n. sp. — ♀. Long. 10,5 mill. Abd. long. 7 mill., lat. 10,3 mill. — Cephalothorax, pedes, sternum, chelæque lète aurantiaca. Cephalothoracis pars cephalica elevata, in medio sulcata, utrinque convexa et prominula, setis albis spiniformibus et leviter elevatis conspersa. Area oculorum mediorum subquadrata, oculi antici posticis paulo maiores. Abdomen altissimum, maximum, multo latius quam longius, supra deplanatum, antice et utrinque fere recte truncatum, postice late emarginatum cum angulis productis depresso et tuberculatis, postice in declivitate aculeo graciliore insigniter armatum, supra fulvum, granulis parvis nigris conspersum et impressionibus ocelliformibus maximis lète coccineis novem marginatum, in lateribus infuscatum, crebrius nigro-granulosum et tuberculis humillimis (anticis binis subgeminatis et angularibus reliquis paulo majoribus) fere inordinate conspersum. Abdomen subtus rufulum nigro-granulosum. Mamillæ rufulo-cinctæ. Chelæ setis albidis subclavatis conspersæ. Vulva processu humili, semi-circulari et postice foveolato, munita. — Brasilia : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

**X. perlatus**, n. sp. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, regione frontali ferruginea, parte cephalica convessa, longitudinaliter sulcata et pone oculos transversim depressa. Oculi medii subæquales, aream subquadratam occupantes. Clypeus area oculorum mediorum circiter æquilatus. Abdomen subrotundum, supra depresso, utrinque alte et inæqualiter carinatum, fuscum et fulvo-variatum, coriaceum et plagulis lævioribus convexis crebre obtectum, ad marginem tuberculis grossis numerosis, rotundis, nitidis et rufulis carinas tuberculis majoribus sex nigris, rufis et flavis munitum; subtus nigricans, in medio ferrugineum, obtuse granosum et utrinque, secundum mamillas, tuberculis nigris quatuor munitum. Sternum fusco-ferrugineum, nitidum, sed leviter inæquale, in medio paululum depresso. Chelæ fulvo-

rufescentes, læves et nitidae. Pedes fulvo-rufescentes, femoribus anticis annulo subbasali ferrugineo, tibiis annulo medio nigricanti ornatis, femoribus tibiisque 4<sup>i</sup> paris nigricantibus apice anguste fulvis, femoribus inferne grosse et inæqualiter granulosis, tibiis anticis supra paululum deplanatis et versus basin leviter angustioribus. Vulva fovea trapezoidalii et unco brevissimo munita. — Mato-Grosso (Germain).

**X. scrupeus**, n. sp. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax obscure fuscus, regione frontali, præsertim ad apicem, dilutiore et rufescenti, pilis crassis et obtusis fulvo-nitidis conspersus, fronte in medio leviter depressa, utrinque convexa et prominenti. Oculi medii subæquales, aream latiorem quam longiorem et antice quam postice paulo angustiores occupantes. Abdomen fere æque longum ac latum, altum, sed supra planum et excavatum, antice rotundum et parte thoracica obtecum, postice sensim elevatum et obtusissime truncatum, supra obtuse et sat dense granulosum et impressionibus ocelliformibus granulosis in medio lævioribus fere inordinate ornatum, ocello antico reliquis majore rotundo sed parte media lævi elongato-lanceolata, ad marginem et præsertim ad declivitatem posteriorem tuberculis obtusis medio-cribus inquis inordinate aratum, subtus valde rugosum. Sternum fuscum nigrumve, coriaceum, leviter depresso. Chelæ coriaceæ parce et crasse albo fulvoque pilosæ. Pedes breves et robusti, fulvo vel fusco-rufescentes, crasse et valde albido-setosi.

♂. Long. 6,5 mill. — Femina non multo minor, fere similis, sed omnino niger. Pedes-maxillares obscure olivacei, breves; femore gracili, compresso, fere recto; patella parva et subquadrata; tibia patella breviore sed latiore, extus in tuberculum rectum et obtusissimum producta; tarso bulboque maximis; tarso oblique truncato cum angulo exteriore apophysi parva gracili sed obtusa munito; bulbo supra fusco, leviter reniformi, subtus membranaceo. — Brasilia : Prov. Para et Amazonas (de Mathan); Bahia (E. Gounelle); Mato-Grosso (Germain).

**Glyptogona duriuscula**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax rufescens, parce granulosus, parte cephalica postice elevata, lævissime sulcata et utrinque late foveolata. Oculi medii aream parallelam, paulo longiorem quam latiorem, occupantes, antici posticis maiores. Abdomen duriusculum, fulvum, parce et minute granosum, antice sat angustum et leviter emarginatum, postice sensim ampliatum et truncatum, tuberculo medio obtuso, utrinque tuberculis marginalibus parvis binis tuberculisque angularibus plurimis munitum, postice

rimis transversis profundis utrinque mucronatis impressum. Sternum pedesque fulvo-ravida, femoribus subtus minute biseriatim tuberculatis. — Ceylan : Kandy !.

**G. sexlobata**, n. sp. — ♀. Long. 4,5 mill.— Cephalothorax opacus, parce granosus et crasse pilosus, niger, prope medium lineolis binis fulvis notatus. Area oculorum mediorum subquadrata, oculi medii antici posticis majores. Abdomen latius quam longius, obscure fulvum, parce et grosse nigro-granosum, antice sat angustum et truncatum, postice validissime elevatum et ampliatum et utrinque lobis grossis rotundis (angulari reliquis majore et leviter pediculato) instructum. Sternum nigricans. Pedes valde luteo nigroque annulati, femoribus subtus tubercululis spinigeris biseriatis munitis. — Peru : Pebas.

